Bolilla 2: Movimiento en una y en dos dimensiones

<http://www.walter-fendt.de/ph14s/>

Bolilla 2: Movimiento en una y en dos dimensiones

- El estudio del movimiento se basa en medidas de *Posición*, *Velocidad*, y *Aceleración*.
- Determinada la Posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia adecuado, entendemos por **movimiento** al cambio continuo en la posición del cuerpo.
- Consideramos sólo movimientos de traslación: cada parte del objeto se mueve en la misma dirección (no hay rotación).

2.1 Movimiento rectilíneo

- El movimiento se lleva a cabo sobre una línea recta.
- El Sistema de Referencia adecuado consiste en un eje coordenado, sobre el cual se indica la posición del cuerpo en un tiempo determinado:

- t → tiempo (s, hs, días, años)
- $\vec{x}$ → posición (cm, m, km)
- $\Delta\vec{x}$ → desplazamiento

2.1.1 Velocidad media - Velocidad instantánea

$\vec{x}_1$ posición en $t = t_1$
 $\vec{x}_2$ posición en $t = t_2$

$\vec{\Delta x} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1$ es el desplazamiento

La velocidad media es:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

La velocidad instantánea es: $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$, dirección tangente a la trayectoria

Algunas propiedades de las gráficas x vs t y v vs t

-La pendiente de la recta r_1 (secante) equivale al módulo de la velocidad media en el intervalo t_1, t_2 .

-La pendiente de la recta r_2 (tangente) equivale a la velocidad instantánea en t_1

·El área bajo la curva v vs. t entre los tiempos t_0 y t_1 , es equivalente al módulo del desplazamiento entre los tiempos t_0 y t_1 .

$$dx = v dt$$

$$\Delta x = \int_{t_0}^{t_1} v dt = v \int_{t_0}^{t_1} dt$$

2.1.2 Movimiento rectilíneo uniforme

Un objeto tiene **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)** cuando su trayectoria es recta y su velocidad constante.

Consecuencias:

- La velocidad media, para cualquier intervalo de tiempo, es igual a la instantánea.
- El desplazamiento es proporcional al tiempo empleado en recorrerlo.
- La gráfica posición-tiempo (x vs. t) es una recta cuya pendiente es igual al módulo de la velocidad.
- La gráfica velocidad-tiempo (v vs. t) es una recta horizontal (paralela al eje t).

tiempo (s)	distancia (m)
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8

2.1.2 Movimiento rectilíneo uniformemente variado

Se denomina aceleración al cambio de la velocidad con el tiempo.

aceleración media: $\vec{a}_m = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ $[a] = \text{m/s}^2$

aceleración instantánea: $a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$, dirección: tangente a la curva v vs. t

Un objeto tiene **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)** cuando su trayectoria es recta y su aceleración es constante

Consecuencias:

- La aceleración media, para cualquier intervalo de tiempo, coincide con la aceleración instantánea. La gráfica $\mathbf{a}$ vs. $\mathbf{t}$ es una recta horizontal.
- La velocidad es proporcional al tiempo. La gráfica $\mathbf{v}$ vs. $\mathbf{t}$ es una recta cuya pendiente coincide con el valor numérico de la aceleración.
- La velocidad media, en cualquier intervalo de tiempo, es la semisuma de las velocidades inicial y final en dicho intervalo.
- La relación entre el desplazamiento y el tiempo es cuadrática. La gráfica $\mathbf{x}$ vs. $\mathbf{t}$ es una parábola.

Gráficas y Ecuaciones del MRUV

Galileo
1564-1642

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t$$

$$\vec{x} = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x-x_0)$$

[Simulación MRUV](#)

2.1.4. La aceleración de la gravedad

Un objeto se mueve en caída libre si la gravedad es el único factor que interviene en su movimiento.

- La aceleración gravitatoria, $\vec{g}$, es la misma para todos los objetos que caen, sea cual sea su tamaño o su composición.
- La aceleración gravitatoria es constante.
- Cerca de la superficie terrestre, el módulo de la aceleración gravitatoria es: $g=9.8 \text{ m/s}^2$.
- En el estudio de la caída libre de los cuerpos, podemos utilizar las ecuaciones del **MRUV**.

Ejemplos de aceleraciones gravitatorias (m s^{-2})

<i>Asteroide Vesta</i>	<i>0,3</i>
<i>Luna</i>	<i>1,6</i>
<i>Marte</i>	<i>3,7</i>
<i>Tierra</i>	<i>9,8</i>
<i>Jupiter</i>	<i>26</i>
<i>Sol</i>	<i>270</i>
<i>Agujero negro</i>	<i>10^{52}</i>

2.2. Movimiento en dos dimensiones

En t_1 el móvil se encuentra en el punto 1, con posición $\vec{r}_1$

En t_2 el móvil se encuentra en el punto 2, con posición $\vec{r}_2$

El desplazamiento es: $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j}$

La velocidad media es:

$$\vec{V}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \hat{j} = V_{mx} \hat{i} + V_{my} \hat{j}$$

Dirección secante a la curva por los puntos 1 y 2

La velocidad instantánea es: $\vec{V} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j}$

Dirección tangente a la curva

Donde:

$$V_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad \Bigg| \quad V_y = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{dy}{dt}$$

Aceleracion media e instantánea

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \hat{j} = a_{mx} \hat{i} + a_{my} \hat{j}$$

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \text{ con } a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t}; a_y = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_y}{\Delta t}$$

2.2.1 Movimiento de proyectiles

Movimiento que se efectua en un plano vertical, en la proximidad de la tierra y afectado solamente por la aceleracion $\vec{g}$.

- La componente **x** de la aceleración es cero, por lo tanto en esta dirección el movimiento es **uniforme**.
- La componente **x** de la velocidad permanece constante
- Según la dirección **y**, la aceleración es **-g**. En esta dirección el movimiento es **uniformemente variado**.

Ecuaciones del Movimiento de proyectiles

Dirección x

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta$$

$$v_{0x} = x/t$$

Dirección y

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta$$

$$v_y = v_{0y} - gt$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(h-h_0)$$

$$h = h_0 + v_{0y}t - 1/2 gt^2$$

Tiempo total de vuelo:

$$t_T = 2 v_0 \operatorname{sen}q/g$$

Alcance máximo:

$$R = v_0^2 \operatorname{sen}(2q)/g$$

Altura máxima:

$$h_m = (v_0 \operatorname{sen}q)^2/(2g)$$

[Simulación Proyectiles 1](#)
[Simulación Proyetiles 2](#)